

**PRINCIPIOS ACTIVOS**

Deflazacort 6 mg,
Deflazacort 30 mg

CATEGORÍA TERAPÉUTICA

Esteróide Sistémico de
origen Sintético.

TERMINOS RELACIONADOS

Flezacor®, Deflazacort

PRESENTACIÓN

Estuche x 20 Tabletas de
6 mg
Estuche x 15 Tabletas de 30
mg

DATOS DE CALIDAD

No requiere Bioequivalencia

LINEA ETICO**PAISES REGISTRADOS**

*Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá,
República Dominicana*

Flezacor®

INDICACIONES: Enfermedades que responden a corticoterapia:

Enfermedades del colágeno: lupus eritematoso sistémico, cardiopatía reumática aguda, polimiositis.

Enfermedades dermatológicas: pénfigo, dermatitis ampollar herpetiforme, eritema multiforme severo, dermatitis exfoliativa, micosis fungoides, psoriasis grave, dermatitis seborréica severa.

Enfermedades neoplásicas: leucemia, linfomas.

Enfermedades oftálmicas: procesos alérgicos e inflamatorios severos, agudos, y crónicos que afectan los ojos y sus estructuras.

Enfermedades respiratorias: sarcoidosis sintomática, síndrome de Loeffler, beriliosis, tuberculosis pulmonar en combinación con quimioterapia antituberculosa.

Estados alérgicos: rinitis alérgica, pólipos nasales, asma bronquial, dermatitis por contacto, neurodermatitis, reacciones farmacológicas, enfermedad del suero.

Estados edematosos: síndrome nefrótico idiopático.

Trastornos endocrinos: insuficiencia cortico-suprarrenal primaria o secundaria, hiperplasia suprarrenal congénita, tiroiditis no supurante, hipercalcemia asociada a cáncer.

Trastornos hematológicos: trombocitopenia idiopática y secundaria en adultos, anemia hemolítica adquirida, anemia eritrocítica, anemia hipoplásica congénita.

Trastornos osteomusculares: artritis reumatoide, psoriásica o gotosa, osteoartritis, espondilitis anquilosante, bursitis, fibrositis, miositis, tenosinovitis.

Trastornos diversos: colitis ulcerosa, parálisis facial de Bell, trasplante de órganos.

DOSIFICACIÓN: Adultos: 6-90 mg/ día dependiendo de la indicación y la severidad del cuadro clínico.

Niños: 0.25-2 mg/ kg/ día dependiendo de la indicación y la severidad del cuadro clínico.

Cada tableta de 6 mg de FLEZACOR® equivale a 5 mg de prednisona.

El retiro del tratamiento deberá ser siempre gradual.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad al medicamento. Embarazo, lactancia, pacientes con enfermedades infecciosas severas.

Web: www.labstein.com
Email: cliente@labstein.com
Servicio al cliente:
800-STEINSA (800-783-4672)

Central: (506) 2550-6565
Fax: (506) 2550-6535
Apdo Postal: 930-1007
V/04/11



©2010 - Laboratorios Stein S.A.
1 km al sur del cruce de Taras,
sobre autopista Florencio del Castillo,
Cartago, Costa Rica

PRECAUCIONES: Hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca congestiva, diabetes mellitus, osteoporosis, úlcera gástrica activa, miastenia grave, insuficiencia renal, cirrosis, colitis ulcerativa, trastornos tromboembólicos, infecciones. No se debe inmunizar con vacunas a pacientes que estén recibiendo corticoterapia. No se debe combinar con alcohol.

INTERACCIONES: Barbitúricos, fenitoína, carbamazepina, rifampicina: disminución del efecto de deflazacort.

Antidiabéticos, diuréticos y anticoagulantes cumarínicos: deflazacort antagoniza sus efectos

Anticonceptivos orales: aumento de los efectos de deflazacort.

Salicilatos, vacunas: disminución del efecto de éstos.

REACCIONES ADVERSAS: Más frecuentes: insomnio, cefalea, calambres en las piernas, fiebre, nerviosismo, retención de líquidos, infecciones secundarias, molestias gástricas, incremento de apetito.

Menos frecuentes: glaucoma, cataratas, hirsutismo, diabetes mellitus, úlcera gástrica, hipertensión arterial, trastornos menstruales y otras.

Web: www.labstein.com
Email: cliente@labstein.com
Servicio al cliente:
800-STEINSA (800-783-4672)

Central: (506) 2550-6565
Fax: (506) 2550-6535
Apdo Postal: 930-1007
V/04/11



©2010 - Laboratorios Stein S.A.
1 km al sur del cruce de Taras,
sobre autopista Florencio del Castillo,
Cartago, Costa Rica