

QUÍMICA DEL PRINCIPIO ACTIVO: Multivitamínico con Minerales	
NOMBRE QUÍMICO:	
FÓRMULA:	PESO MOLECULAR:
SINÓNIMOS:	
ASPECTO DE LA SUSTANCIA:	
SOLUBILIDAD:	
NÚMERO CAS:	
CÓDIGO ATC:	

GERIÁTRICO®

(líquido)

1- Nombre comercial:

Geriatrico®.

2- Nombre genérico:

Multivitamínico con minerales.

3- Forma farmacéutica y formulación:

Multivitamínico con minerales líquido

Cada cucharada (15 ml) contiene

Vitamina A palmitato.....	2 500 UI
Tiamina HCl (vitamina B1).....	1,15 mg
Riboflavina (vitamina B2).....	1,7 mg
Niacinamida.....	20 mg
Ácido pantoténico (d-pantenol).....	10 mg
Piridoxina HCl (vitamina B6).....	2 mg
Vitamina B12 (cianocobalamina).....	6 mcg
Ácido ascórbico (vitamina C).....	60,0 mg
Colecalciferol (vitamina D3).....	400 UI
dl-alfa-tocoferil acetato (vitamina E).....	30 mg
Biotina.....	300 mcg
Hierro (gluconato dihidratado).....	9 mg
Zinc (gluconato).....	3 mg
Manganeso (cloruro tetrahidratado).....	2,5 mg
Yodo (potasio yoduro).....	150 mcg
Cromo (cloruro hexahidratado).....	25 mcg
Molibdeno (sodio molibdato dihidratado).....	25 mcg
Bitartrato de colina.....	50 mg
Excipientes c.s.p.	

4-Indicaciones terapéuticas:

Geriatrico® líquido está indicado como terapia adjunta de las manifestaciones que acompañan a los procesos de disminución de la capacidad física y mental, para las deficiencias de los componentes de la fórmula (vitaminas, minerales y oligoelementos) como ocurre en:

- Deporte y actividades recreativas.
- Bajo rendimiento laboral y escolar.
- Cansancio y fatiga.
- Baja concentración mental.
- Malos hábitos alimenticios.
- En periodos de convalecencia.
- Bajo rendimiento físico.
- Deficiencias de vitaminas y minerales.

5-Contraindicaciones:

Geriatrico® líquido está contraindicado en los pacientes con hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.

Geriatrico® líquido no debe usarse en el paciente con insuficiencia renal o hepática grave.

6-Precauciones:

Geriatrico® líquido no debe administrarse con otros complementos vitamínicos y/o minerales, sobre todo aquellos que contienen vitaminas liposolubles, a menos que esto sea indicado específicamente por un médico.

En los estados en los cuales el requerimiento específico de algún elemento de la fórmula sea requerido en dosis elevadas (ej: anemia perniciosa, deficiencia de ácido fólico) no se administrará Geriatrico® líquido sino el requerimiento específico a la dosis que el médico señale a menos de que el médico indique el uso simultáneo

de ambos productos.

Geriátrico® líquido no deberá ser administrado en menores de 18 años.

Dado que en pacientes con enfermedad hepática o insuficiencia renal de ligera a moderada la eliminación del producto se puede ver afectada se recomienda precaución durante la duración del tratamiento con este producto.

7-Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia:

No se recomienda el uso de Geriátrico® líquido durante el embarazo ni en la lactancia. La probabilidad de riesgo fetal con el uso de suplementos de multivitamínicos con minerales durante el embarazo es muy baja. Sin embargo, las dosis altas de vitamina A y D pueden presentar riesgos teratogénicos.

8-Reacciones secundarias y adversas:

Se ha reportado cefalea, mareos y reacciones gastrointestinales (ej: náusea, dolor de estómago, vómitos y diarreas).

Las reacciones adversas pueden corresponder a las descritas por la sobredosificación. Sin embargo, en las condiciones de prescripción-dosificación de Geriátrico® líquido no se presentan este tipo de reacciones ni mucho menos a las dosis recomendadas o prescritas.

9- Carcinogénesis, mutagénesis y trastorno de la fertilidad:

No se han reportado.

10-Interacciones medicamentosas y de otro género:

Debido a una posible interferencia en la absorción se recomienda tomar Geriátrico® líquido con al menos 2 horas de diferencia de los

antiácidos, la leche y los antibióticos del grupo de las tetraciclinas.

11-Dosis y vía de administración:

Geriátrico® líquido se administra por vía oral.

Adultos y mayores de 18 años: Tomar de 1 a 3 cucharaditas (de 5 a 15 mL) al día. Una dosis fácil de recordar es tomar 1 cucharada (15 mL) de una sola vez. Se recomienda tomarlo de preferencia con el desayuno ó alguna comida.

12- En caso de sobredosificación o ingesta accidental:

En caso de una sobredosis aguda y si la ingestión es reciente debe vaciarse el estómago, observar al paciente, mantener una adecuada hidratación y brindar tratamiento sintomático. Este producto contiene vitaminas A y D que en altas dosis pueden tener consecuencias desfavorables. La sobredosificación del producto puede producir nerviosismo.

13- Presentación:

Geriátrico® líquido

Frasco con 240 ml, cada cucharada (15 ml) contiene multivitamínicos y minerales (ver acápite fórmula farmacéutica y formulación).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: