



Sulfadiazina de Plata

ALIVIO EFICAZ DE LAS QUEMADURAS

Excelente en el tratamiento de quemaduras de 2do y 3er grado

1. Efectiva acción regeneradora de la piel contra las quemaduras.

Antibacteriano y cicatrizante tóxico.

MODO DE EMPLEO: Inicialmente debe lavarse y limpiarse la herida. Se aplica con un guante estéril, una capa de 3 mm de grosor sobre la superficie lesionada, cubriéndola con un vendaje, 2-3 veces al día. En quemaduras y heridas no muy contaminadas puede requerirse las siguientes aplicaciones cada 4 a 6 horas.

INDICACIONES: Prevención de infecciones en quemaduras de 2do y 3er grado, úlceras en las piernas, curación de heridas cutáneas.

CONTRAINDICACIONES: No debe de utilizarse en embarazo, lactancia ni en niños menores de 1 año. Se recomienda reservar cada envase para cada paciente, por el riesgo de infectar a otro.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Sulfadiazina de Plata 40 g

PRESENTACIÓN

Estuche x tubo con 40 g
Frascos de 400 g.

CATEGORÍA TERAPÉUTICA

Atibacteriano y Cicatrizante
Tópico

DATOS DE CALIDAD

No requiere Bioequivalencia

TERMINOS RELACIONADOS

Sulfadiazina de plata

LINEA PME

PAISES REGISTRADOS

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá.

Web: www.labstein.com

Email: cliente@labstein.com

Servicio al cliente:

800-STEINSA (800-783-4672)

Central: (506) 2550-6565

Fax: (506) 2550-6539

Apdo Postal: 930-1007

V/01/11



©2010 - Laboratorios Stein S.A.
1 km al sur del cruce de Taras,
sobre autopista Florencio del Castillo,
Cartago, Costa Rica