



# Uninorm

Hipnótico, sedante no benzodiazepínico.

**INDICACIONES:** Tratamiento a corto plazo del insomnio y trastornos del sueño.

**CONTRAINDICACIONES:** Hipersensibilidad al medicamento. Período de lactancia y pacientes con apnea nocturna.

**DOSIFICACION:** La dosis usual para adultos es 5-10 mg inmediatamente antes de acostarse, preferiblemente con el estómago vacío.

En la vejez es recomendable la mitad de la dosis para adultos.

La duración del tratamiento puede ser 7-14 días pero no mayor a 14 días.

Pacientes con insuficiencia hepática: 5 mg inmediatamente antes de acostarse.

**INTERACCIONES:** Ritonavir, depresores del SNC y sertralina: pueden aumentar los efectos o la toxicidad del zolpidem. Rifampicina: disminución del efecto del zolpidem.

**REACCIONES ADVERSAS** Poco frecuentes: ataxia, confusión, depresión mental, pesadillas, mareo, náusea, diarrea, amnesia, temblor, vómito, trastornos visuales y otras.

**PRECAUCIONES:** EPOC, depresión, abuso de drogas. No se debe ingerir alcohol durante el tratamiento. Produce somnolencia.

**PRINCIPIOS ACTIVOS**  
uninorm, zolpidem hemitartrato

**CATEGORÍA TERAPÉUTICA**  
Cardiovascular

**TERMINOS RELACIONADOS**  
uninorm, zolpidem hemitartrato

**PRESENTACIÓN**  
Tabletas recubiertas  
de 75 mg Caja x 14

**DATOS DE CALIDAD**  
No requiere Bioequivalencia

**LINEA OTC**

**PAISES REGISTRADOS**  
Costa Rica, El Salvador, Honduras,

Web: [www.labstein.com](http://www.labstein.com)  
Email: [cliente@labstein.com](mailto:cliente@labstein.com)  
Servicio al cliente:  
800-STEINSA (800-783-4672)

Central: (506) 2550-6565  
Fax: (506) 2550-6535  
Apdo Postal: 930-1007  
**V/04/11**