



Zostrix[®] 

EFFECTIVO EN EL HERPES LABIAL Y GENITAL

Mantiene controlado el herpes labial y elimina las molestias altas

1. La presentación en crema facilita su aplicación en los labios
2. Alivia eficazmente el picor, ardor y hormigueo en la zona afectada

Antiviral.

DOSIS RECOMENDADA: Crema: Aplicar en la superficie afectada 6 veces al día (cada 3 horas) durante 7 días. Omitiendo la dosis nocturna. Tabletas: 400 mg cada 12 horas.

INDICACIONES: Indicaciones cutáneas y mucosas, iniciales o recurrentes, producidas por virus Herpes simples tipo I y II y varicela-zoster, incluyendo el herpes genital, y en pacientes inmunodeprimidos. Virus Epstein-Barr.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad al aciclovir, embarazo y lactancia.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Zostrix

PRESENTACIÓN

Uso topico. Crema labial al 5%, tubo 5 g.

CATEGORÍA TERAPÉUTICA

Medicamentos esenciales

DATOS DE CALIDAD

No requiere Bioequivalencia

TERMINOS RELACIONADOS

Aciclovir

LINEA PME

PAISES REGISTRADOS

El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua

Web: www.labstein.com

Email: cliente@labstein.com

Servicio al cliente:

800-STEINSA (800-783-4672)

Central: (506) 2550-6565

Fax: (506) 2550-6535

Apdo Postal: 930-1007

V/04/11